

# ●予防接種カレンダー●

北広島町役場 保健課 健康増進係 電話:050-5812-1853

令和2年9月1日作成

種類	ワクチン名	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6~8か月	9~11か月	1歳 (12か月)	1歳3か月 (15か月)	1歳6か月 (18か月)	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳5か月 (90か月)	8歳	9歳	11歳	
不活化ワクチン	B型肝炎		①	②																	
										生後2月以上生後9月未満 ①と②は、27日以上の間隔 ③は①の接種から139日以上の間隔をおく											
不活化ワクチン	Hib(ヒブ) (インフルエンザ菌b型)		①	②	③																
										初回接種開始は、生後2月から生後7月未満 ①と②と③は、27日以上の間隔をおく ④の追加は、③終了後、7月から13月までの間隔をおく 初回の②、③は生後12月未満までに終了する											
不活化ワクチン	小児用肺炎球菌		①	②	③																
										初回の開始は、生後2月から生後7月未満 ①と②と③は、27日以上の間隔をおく ④の追加は、③終了後、60日以上の間隔をおいて生後12月 から生後15月未満											
不活化ワクチン	四種混合 (DPT-IPV)			①	②	③															
										1期初回は生後3月に達した時から生後12月未満 ①と②と③は、20日以上の間隔をおく ④の追加は、③終了後、6月以上の間隔をおく(標準的には12月から18月までの間隔をおく)											
不活化ワクチン	二種混合(DT)																				
										11歳以上12歳未満(小学6年生)											
																					①
生ワクチン	BCG																				
										生後5月以上生後8月未満											
生ワクチン	麻疹・風疹(MR)																				
										①は、1歳以上2歳未満											
										①											
										②											
										5歳以上7歳未満 (年長児:小学校入学前の1年間)											
生ワクチン	水痘																				
										1回目は1歳以上1歳3か月未満											
										①											
										②											
										①と②は、3月以上の間隔をおく(標準的には①の終了後6月以上12月未満)											
不活化ワクチン	日本脳炎																				
										1期初回①②は、3歳以上4歳未満 1期追加③は4歳以上5歳未満											
										①②											
										③											
										①と②は、6日以上(概ね6日~28日)の間隔をおく ②と③は、6月以上(概ね1年)の間隔をおく											
										④											
										2期④は9歳以上10歳未満 (小学4年生)											
生ワクチン	ロタウイルス																				
										5価経口弱毒性ロタウイルスワクチン:初回接種後、生後32週までに27日以上の間隔をおいて3回接種											
										経口弱毒性ヒトロタウイルスワクチン:初回接種後、生後24週までに27日以上の間隔をおいて2回接種											
										令和2年10月1日から定期接種になりました。令和2年8月1日以後に生まれた者が対象となります。 2つのワクチンは接種回数異なります。最初に受けたワクチンと同じ種類を接種してください。 初回接種は、生後6週から生後14週6日までに受けてください。											

接種可能年齢期間(定期予防接種として接種可)

標準的な接種期間